

Bedienungsanleitung



Fostimon®

Einführung

Die Behandlung, die Ihnen verschrieben worden ist, setzt voraus, dass das Fostimon für den Gebrauch zubereitet wird, bevor es injiziert wird. Fostimon kann entweder subkutan oder intramuskulär injiziert werden. Fostimon muss unmittelbar nach der Zubereitung des Pulvers für den Gebrauch verwendet werden. Die zubereitete Lösung ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Eine ausführliche Bedienungsanweisung finden Sie auf der Rückseite.

Ihr behandelnder Arzt wird Ihnen die für Sie richtige Dosierung von Fostimon verschreiben. Sie variiert von Person zu Person.

Unvermischt ist das Pulver für die Fostimon-Zubereitung und die Injektionslösung zwei Jahre haltbar.

Fostimon kann bei Zimmertemperatur, jedoch nicht über 25 °C, gelagert werden.

Das Präparat in der Originalverpackung belassen. Vor Licht schützen.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

www.infucare.se

Fostimon®

Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Fostimon-Zubereitung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch:



- 1 Waschen und trocknen Sie Ihre Hände sorgfältig, bevor Sie das Medikament zubereiten.

Nehmen Sie die erforderlichen Utensilien heraus, und legen Sie sie auf eine saubere Fläche:

- Reinigungstuch
- Fläschchen mit dem Fostimon-Pulver für die Injektion
- Ampulle mit der Injektionslösung (NaCl 0,9 %)
- Ampullenöffner
- Injektionsspritze + -Nadel

Zubereitung der Injektionslösung



- 2 Entfernen Sie die Schutzkappe von dem Fläschchen mit dem Fostimon-Pulver für die Injektionslösung. Wischen Sie den Gummistopfen auf dem Fläschchen mit dem Reinigungstuch ab.

- 3 Klopfen Sie vorsichtig gegen die Spitze der Ampulle, so dass etwaige noch in der Spitze befindliche Lösung nach unten in die Ampulle fließt.



- 4 Die Ampullenspitze hat eine kleine Markierung, an der sich der Hals leicht abbrechen lässt. Setzen Sie den Ampullenöffner so auf die Ampulle, dass die Markierung zu Ihnen zeigt. Brechen Sie die Spitze der Ampulle ab, indem Sie den Öffner vorsichtig von sich weg schieben.



Markierung

Ziehen Sie nun die Lösung mithilfe der Injektionsspritze aus der Ampulle heraus.



- 5 Stechen Sie die Injektionsspritze mit der Lösung durch den Gummistopfen des Fläschchens mit dem Fostimon-Pulver, und spritzen Sie die Lösung langsam in die Flasche hinein. Schwenken Sie das Injektionsfläschchen vorsichtig mit der Hand, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Nicht schütteln! Wenn sich das Pulver aufgelöst hat (das geschieht in der Regel sofort), ziehen Sie die zubereitete Lösung wieder in die Injektionsspritze. Drehen Sie das Fläschchen dafür mit dem Gummistopfen nach unten.



- 6 Entfernen Sie sämtliche Luftbläschen aus der Spritze. Halten Sie dafür die Spritze mit der Nadel nach oben, und klopfen Sie vorsichtig gegen die Spritze, bis sich alle Luftbläschen im oberen Teil der Spritze versammelt haben. Schieben Sie nun langsam den Spritzenkolben in die Spritze, bis alle Luft aus der Spritze entwichen ist. Die Injektionslösung ist jetzt gebrauchsfertig.



Verabreichung einer subkutanen Injektion



- 7 Wischen Sie die Injektionsstelle mit einem Reinigungstuch ab. Empfohlene Injektionsstellen sind Bauchregion und vordere Oberschenkel. Stellen Sie sicher, dass die dünne Nadel, die für subkutane Injektionen vorgesehen ist, auf der Spritze sitzt.



- 8 Kneifen Sie mit der einen Hand die Haut vorsichtig zusammen, damit eine Falte entsteht, und durchstechen Sie die Haut in einem Winkel von 45° oder 90° mit der Nadel. Injizieren Sie die Injektionslösung unter die Haut, indem Sie den Spritzenkolben langsam und gleichmäßig einschieben, bis die gesamte Dosis unter der Haut ist. Warten Sie 10 Sekunden, und ziehen Sie dann die Nadel heraus. Nadel nach Gebrauch sicher unbrauchbar machen und entsorgen.