



Verkar redan efter
5–10 minuter

Varar ca 1 timme

Behandlar snabbt stelhet



APO-go Pen[®]

vid Parkinsons sjukdom



ParkinsonFörbundet, Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 73, www.parkinsonforbundet.se

Patientinformation

Behandling med APO-Go Pen®

Apo-go Pen innehåller den aktiva substansen Apomorfin. Apomorfin är en dopaminagonist som stimulerar D1- och D2-receptorerna i hjärnan. Den har effekt både mot stelhet (rigiditet), skakningar (tremor) och rörelsefattigdom/rörelsetröghet (hypokinesi).

Apomorfin har tidigare använts i de senare faserna av Parkinsons sjukdom, när de traditionella parkinsonmedicinerna inte längre har samma effekt. Då ges apomorfinet med pumpen **APO-go II** (om patienten blir hastigt stel eller har snabba växlingar mellan övriga ON/OFF-fluktuationer).

Apo-go Pen används i tidigare skede i behandlingen, redan när det visar sig att den konventionella tablettbehandlingen inte är tillräcklig och patienten börjar få problem med dosglapp (s k OFF). När stelheten börjar bli ett dagligt problem är APO-go Pen ett behandlingalternativ att överväga. OFF uppstår oftast mellan 2 och 5 år efter startad tablettbehandling. Apo-go Pen används då som komplement till tablettbehandling och oftast behöver man inte ändra sin tablettbehandling.

Med Apo-go Pen behandlar man enkelt och säkert sin parkinsonsjukdom. Apo-go Pen verkar redan efter 5–10 minuter, ibland ännu snabbare och effekten sitter oftast i cirka

1 timme. Den kan dock variera för olika patienter – från 30 till 90 minuter. Det är viktigt att veta att varje patient har sin egen verkningstid och att den är samma från gång till gång.

Ytterligare fördelar med Apo-go Pen:

- Patienter med sväljproblem får ett alternativ till tablettbehandlingen.
- Man behöver inte vara rädd för i vilken kondition mage och tarm befinner sig.
- Det spelar inte någon roll vad man ätit – vilket kan vara ett problem med tablettbehandling.

Apo-go Pen sätts in första gången på mottagningen. Därefter sköter patienten behandlingen själv varje gång han/hon får ett dosglapp (OFF) i sin tablettbehandling. Man bör medicinera varje dag. Skulle man känna behov av fler än 5–6 doser per dag bör man rådfråga sin doktor. Kanske behöver man då ändra sin medicinering.

Den dos som man blir inställd på är samma dos som man sedan använder varje gång. Detta innebär att man inte behöver ändra sin dos när man väl startat behandlingen. Man får samma effekt varje gång man tar sin dos med Apo-go Pen, något som leder till ökad trygghet i behandlingen.

Trots namnet Apomorfin har det inget med morfinbehandling att göra. Apomorfin har inget av morfins narkotiska egenskaper och är inte beroendeframkallande.

Medicinering mot illamående

En del patienter kan inledningsvis känna sig illamående av behandlingen. Därför brukar alla Apo-go Pen-patienter under de första 4–6 veckorna även medicinera mot illamående. Oftast kan man sedan fortsätta sin parkinsonbehandling utan detta tillägg men det kan hända att man även fortsättningsvis behöver behandla mot illamående.

Övriga biverkningar

De vanligaste biverkningarna, förutom illamående, som kan förekomma vid Apo-go Penbehandling är:

- trötthet
- noduli – hudreaktioner vid insticksstället. *(Det är viktigt att byta nål och injektionsställe ofta).*

Med Apo-go Pen föreligger liten risk för överdosering och det är också mycket sällsynt med övriga biverkningsproblem med denna behandlingsform.